



INSTRUCTION PRÉ-TRAITEMENT

Plasma Riche en Plaquettes (PRP)

Si vous développez de la **fièvre, un rhume/une grippe ou que vous développez un une irritation, etc. dans la région à être traitée** la veille ou la journée de votre rendez-vous, vous devez déplacer votre rendez-vous (*nous ne vous traiterons pas*).

Il est recommandé, si vous avez une vaccination ou un autre évènement important qui s'en vient, que vous déplaçiez votre rendez-vous pour votre traitement **au moins deux semaines** à l'avance (nous préférons 3-4).

Si vous êtes traité **dans la région des lèvres** et que vous avez une **historique d'Herpes (bouton de fièvre)** qui apparaît plus de quatre fois par année, certains cliniciens vous suggère de vous faire traiter par une médication avant le traitement. Si tel est le cas, veuillez aviser Dre Ducasse. Elle vous proposera une médication en prévention.

L'utilisation de médicaments anti-inflammatoires (stéroïdiens ou non-stéroïdiens) comme: Aspirin, Motrin (ou quelconque médicament avec de l'Ibuprofen) est à cesser au moins une semaine avant le traitement. Avec les injections PRP, nous voulons une réaction inflammatoire puisque c'est par ce mécanisme que le PRP active la production de collagène.

Si vous êtes traité(e)s avec **des Corticostéroïdes (stéroïdes)**, nous ne pouvons vous traiter.

Cessez l'utilisation des produits suivants: Vitamine E, Vitamine A, Gingko Biloba, l'ail, Flax Oil, l'huile de foie de morue, les acides gras essentiels (EPA, DHA) etc. au moins une semaine avant et après le traitement pour minimiser les bleus et les saignements.

Il est recommandé que vous évitiez: l'alcool, la caféine, les suppléments de Niacin, la nourriture épicée, et les cigarettes 48 heures avant et après le traitement. *Tous ces facteurs pourraient augmenter la formation d'ecchymoses (bleus)*